COVID-19 백신
면역력 저하 상태인 사람을 위한 접종

화이자 또는 모더나 백신을 기본 접종으로 맞은 경우

중등도에서 중증의 면역력이 저하된 (예: 혈액 관련 암 또는 특정 항암치료, 장기 이식, 특정 자가면역 질환) **만 12세 이상의 사람에게는 mRNA 백신의 추가(3차) 접종이 강력히 권장됩니다.**

3차 접종을 위한 백신은 기본 접종으로 받은 백신과 **동일한 COVID-19 백신**이어야 합니다. COVID-19 백신의 추가 접종의 필요성에 대해 담당 의사와 상담하고 현재 치료 계획에서 최적의 접종 시기는 언제인지 문의하십시오. 이것은 면역 억제 치료를 시작하거나 재개하려는 경우에 특히 중요합니다.

부스터샷 접종은 추가(3차) 접종을 받은 후 최소 6개월 후에 접종할 것을 **강력히 권장하며** 모든 종류의 COVID-19 백신을 접종할 수 있습니다.

화이자 - 화이자 백신을 추가 접종해야 합니다

모더나 – 모더나 백신을 추가 접종해야 합니다



존슨앤드존슨(J&J) 백신을 기본 접종으로 맞은 경우

기본 접종으로 J&J 백신을 접종한 중등도에서 중증의 면역 저하 환자에게 3차 접종을 강력히 권장합니다. 현재 치료 계획에 따라 최적의 시기가 언제인지 담당 의사와 상담하십시오. 이것은 면역억제 치료를 시작하거나 다시 시작하려는 사람에게 특히 중요합니다.



기본 접종이 세계보건기구(WHO)에 등재된 백신이거나 임상 시험 중인 백신을 접종한 경우
만 12세 이상이고 미국에서 백신 접종을 모두 완료한 것으로 간주되고, **또한** 중등도에서 중증의 면역 저하가 있는 사람은 **화이자 COVID-19 백신**을 추가 접종을 받을 것을 강력히 권장합니다. 기본 접종을 완료한 후 최소 28일 후에 접종해야 합니다.

COVID-19 백신의 추가 접종의 필요성에 대해 담당 의사와 상담하고 현재 치료 계획에 따라 최적의 접종 시기를 문의하십시오. 이것은 면역 억제 치료를 시작하거나 재개하려는 경우에 특히 중요합니다. 추가(3차) 접종을 받은 후 최소 6개월 후에 부스터샷을 접종할 것을 권장합니다. **화이자 COVID-19 백신은 미 식품의약국(FDA) 승인/인가 COVID-19 백신 기본 접종을 받지 않은 사람을 대상으로 추가 접종 또는 부스터샷 접종의 승인을 받은 유일한 백신입니다.**

자세한 정보는 ph.lacounty.gov/VaccineAppointment를 방문하십시오.

County of Los Angeles Public Health